

## Hogyan zajlik a vizsgálat?

### „Hátra ragasztós” allergia-teszt

A fogászatban használatos anyagokra kialakult allergia vizsgálata az ún. „epikután teszt” segítségével történik, amely során a gyanúba vett anyagokat egy tapaszon az Ön hátára ragasztjuk, majd 20 perc, 40 perc, 24, 48 és 72, 96 óra és 7 nap múlva leolvassuk. A vizsgálat az allergológus szakma szabályait szem előtt tartva veszélytelen.

### Vérteszt

Az érzéstelenítő- és gyógyszerallergia vizsgálat vérből történik. A vizsgálat során a levett vért hozzuk össze a kérdéses gyógyszerekkel, hatóanyagokkal, vívíóanyagokkal, és teszteljük, hogy kiváltak-e a vérben megtalálható immunsejteken olyan elváltozásokat, melyek az allergiás tünetekért felelnek. A megfelelő vizsgálat kiválasztásához, elvégzéséhez speciális szaktudás, és az Ön részletes kikérdezése szükséges.

### Dr. Balogh Katalin

főorvos

szakvizsgák:

allergológia,

klinikai immunológia,

fül-orr-gégészet



## Miért a Budai Allergiaközpont?

- kellemes, családbarát környezet
- szakmailag elismert orvosok
- nincs órákig tartó sorban állás
- könnyű megközelíthetőség
- betegorientált ellátás



Budai Allergiaközpont

1015 Budapest, Ostrom u. 16.

+36-30/631-93-09

<http://www.allergiakozpont.hu>

skype: allergiakozpont

VALÓDI SEGÍTSÉG ALLERGIÁBAN  
**FOGÁSZATI ALLERGIA**  
TÜNETMENTESSÉG ÉVEKEN KERESZTÜL



**AZ EGYETLEN  
HOSSZÚ TÁVÚ  
GYÓGYMÓD  
ALLERGIÁSOKNAK**



**BUDAI ALLERGIKÖZPONT**  
ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN

[WWW.ALLERGIAKOZPONT.HU](http://WWW.ALLERGIAKOZPONT.HU)

## Mi okozhat allergiát a fogászatban?

1. Helyi érzéstelenítők, gyógyszerek.
2. Latex (gumikesztyű).
3. Fogak ún. fehértöméséhez, valamint gyökértöméshez használatos anyagok.
4. Lenyomat vételhez szükséges anyagok.
5. Rögzített fogpótláshoz használt akrilát, fémek, ragasztóanyagok.
6. Fogbeültetés esetén az implantátum anyagát döntően a titán képezi. Erre ritkábban ugyan, de szintén előfordul allergia.
7. Fogkrémekben használt anyagok.



## Milyen tünetei vannak?

A tünetek igen változatosak lehetnek attól függően, hogy mi váltotta ki.

1. Érzéstelenítők azonnal vagy nagyon rövid időn belül fellépő, gyakran súlyos allergiás rosszullétet, **eszméletvesztést, sokkot** okoznak az arra allergiás betegnél. Hasonlóan súlyos rohamot okozhat a latex.

2. Lenyomat anyagokra, egyes helyi kezeléshez használatos szerek bizonyos komponenseire (pl. szegfűolaj, formaldehid) test szerte hirtelen fellépő **bőrkiütések**, az arcon, a száj és szem körül, rosszabb esetben a légutakban kialakuló nagyfokú **vizenyő, asztmatikus légzés**, súlyosabb esetben a keringés összeomlásával kísért ún. **anafilaxiás sokk** jelentkezhet.

3. A szájba beültetett, beépített fémek és egyéb fogpótláshoz használatos anyagoknál jellegzetes az **elhúzódó helyi gyulladás** a fogínyen, a nyelven. Visszatérő **afták** a szájban, ismétlődő bőrkiütések főleg az arcon, száj körül. Kellemetlen égő, csípő érzés a szájüregben.



## Mikor szükséges allergia teszt?

Allergiavizsgálat indokoltsága merülhet fel, ha korábban előfordult:

1. érzéstelenítőtől, gyógyszertől rosszullét
2. fémektől bőrkiütések
3. visszatérő, tartós gyulladás a szájban
4. mással nem magyarázható tünetek
5. ha bármilyen más allergiáról tudomása van

## Miért szükséges az allergia teszt?

A tünetek addig nem szűnnek meg, sőt, többnyire fokozódnak, míg az allergiát okozó anyagot a szervezetből el nem távolítják, illetve alkalmazását meg nem szüntetik.

