Hogyan zajlik a vizsgálat?

„Hátra ragasztós" allergia-teszt
A fogászatban használatos anyagokra kialakult allergia vizsgálata az un. „epikután teszt" segítségével történik, amely során a gyanúba vett anyagokat egy tapaszon az Ön hátára ragasztjuk, majd 20 perc, 40 perc, 24, 48 és 72, 96 óra és 7 nap múlva leolvassuk. A vizsgálat az allergológus szakma szabályait szem előtt tartva veszélytelen.

Vérteszt
Az érzéstelenítő- és gyógyszerallergia vizsgálat vérből történik. A vizsgálat során a levett vért hozzuk össze a kérdéses gyógyszerekkel, hatóanyagokkal, vivőanyagokkal, és teszteljük, hogy kiváltanak-e a vérben megtalálható immunsejteken olyan elváltozásokat, melyek az allergiás tünetekért felelnek. A megfelelő vizsgálat kiválasztásához, elvégzéséhez speciális szaktudás, és az Ön részletes kikérdezése szükséges.

Dr. Balogh Katalin
főorvos
szakvizsgák:
allergológia,
klinikai immunológia,
fül-orr-gégészet

Miért a Budai Allergiaközpont?

- kellemes, családbarát környezet
- szakmailag elismert orvosok
- nincs órákig tartó sorban állás
- könnyű megközelíthetőség
- betegorientált ellátás

Budai Allergiaközpont
1015 Budapest, Ostrom u. 16.
+36-30/631-93-09
http://www.allergiakozpont.hu
skype: allergiakozpont

VALÓDI SEGÍTSÉG ALLERGIÁBAN

FOGÁSZATI ALLERGIA

TÜNETMENTESSÉG ÉVEKEN KERESZTÜL

AZ EGYETLEN HOSSZÚ TÁVÚ GYÓGYMÓD ALLERGIÁSOKNAK

BUDAI ALLERGIAKÖZPONT
ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN

WWW.ALLERGIAKOZPONT.HU

Mi okozhat allergiát a fogászatban?

1. Helyi érzéstelenítők, gyógyszerek.
2. Latex (gumikesztyű).
3. Fogak un. fehértöméséhez, valamint gyökértöméshez használatos anyagok.
4. Lenyomat vételhez szükséges anyagok.
5. Rögzített fogpótláshoz használt akrilát, fémek, ragasztóanyagok.
6. Fogbeültetés esetén az implantátum anyagát döntően a titán képezi. Erre ritkábban ugyan, de szintén előfordul allergia.
7. Fogkrémben használt anyagok.

Milyen tünetei vannak?

A tünetek igen változatosak lehetnek attól függően, hogy mi váltotta ki.

1. Érzéstelenítők azonnal vagy nagyon rövid időn belül fellépő, gyakran súlyos allergiás rosszullétet, **eszméletvesztést, sokkot** okoznak az arra allergiás betegnél. Hasonlóan súlyos rohamot okozhat a latex.

2. Lenyomat anyagokra, egyes helyi kezeléshez használatos szerek bizonyos komponenseire (pl. szegfűolaj, formaldehid) test szerte hirtelen fellépő **bőrkiütések**, az arcon, a száj és szem körül, rosszabb esetben a légutakban kialakuló nagyfokú **vizenyő, asztmatikus légzés**, súlyosabb esetben a keringés összeomlásával kísért ún. **anafilaxiás sokk** jelentkezhet.

3. A szájba beültetett, beépített fémek és egyéb fogpótláshoz használatos anyagoknál jellegzetes az **elhúzódó helyi gyulladás** a fogínyen, a nyelven. Visszatérő **afták** a szájban, ismétlődő bőrkiütések főleg az arcon, száj körül. Kellemetlen égő, csípő érzés a szájüregben.

Mikor szükséges allergia teszt?

Allergiavizsgálat indokoltsága merülhet fel, ha korábban előfordult:

1. érzéstelenítőtől, gyógyszertől rosszullét
2. fémektől bőrkiütések
3. visszatérő, tartós gyulladás a szájban
4. mással nem magyarázható tünetek
5. ha bármilyen más allergiáról tudomása van

Miért szükséges az allergia teszt?

A tünetek addig nem szűnnek meg, sőt, többnyire fokozódnak, míg az allergiát okozó anyagot a szervezetből el nem távolítják, illetve alkalmazását meg nem szüntetik.