

Hogyan vizsgálható?

A **fodrászati és kozmetikai allergiák** megállapítására több tesztelési módszer létezik. A legnépszerűbb az ún. epicután teszt, melynek során 30 különböző, leggyakrabban ekcémát okozó allergént tartalmazó készítményt visznek fel a hát bőrére egyesével, melyet egy speciális ragtapasz segítségével „rögzítenek”. Az eredményt az allergén felvitelének helyén kialakuló bőrelváltozások fajtájából és mértékéből állítják össze.

Dr. Balogh Katalin

szakvizsgák:
allergológus és klinikai immunológus
fül-orr-gégész
specialitások: fogászati allergiák,
allergiás nátha kezelése, allergén
specifikus immunterápia



Dr. Vincze Ildikó

szakvizsgák:
bőrgyógyász, kozmetológus



Miért a Budai Allergiaközpont?

- kellemes, családbarát környezet
- szakmailag elismert orvosok
- nincs órákig tartó sorban állás
- könnyű megközelíthetőség
- betegorientált ellátás



Budai Allergiaközpont

1015 Budapest, Ostrom u. 16.

+36-30/631-93-09

<http://www.allergiakozpont.hu>

skype: allergiakozpont

SEGÍTSÉG AZ ALLERGÉNMENTES
MINDENNAPOKHOZ
LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA!
WWW.ALLERGIABOLT.HU

ALLERGIÁS TÜNETEK A SZÉPSÉGSZALONBAN



**FODRÁSZATI,
KOZMETIKAI ALLERGIÁS
TÜNETEK KEZELÉSE**



BUDAI ALLERGIKÖZPONT
ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN

WWW.ALLERGIAKOZPONT.HU

Fodrászat

Ollók, hajcsatok, csipeszek, szőkítők, festékek és színezők: mindennapos használati eszközök, s valakinek ugyanezek mindennapi problémái is. Égő, vörös, viszkető bőr, vagy éppen nehézlégzés, náthaszerű tünetek. Ezek a fémallergia elsődleges jellemzői.

Tipikus fodrászbetegség

A tapasztalat szerint azok a szerek, amelyek kémiai szerkezetében úgynevezett para állású oldalláncok vannak, gyakrabban váltanak ki allergiát, és már pár molekula is beindíthatja a túlérzékenységet. Ilyen vegyület a parabén mellett például a fekete festékanyag, a parafenilén-diamin. Allergiát válthat ki még az ammonium-perszulfát, ami szőkítő szerekben található. A rezorcin, a pirogallol hajfestékekben, színezőkben, a dauervízben található ammonium-só nemcsak a bőrön okozhatnak tüneteket, de folyamatos belégzésük következtében légúti panaszokat is kiválthatnak.

A nők kétszer-háromszor annyira érzékenyek a nikkelle, mint a férfiak.

– A fodrászok a leginkább érintettek. 100 000 fodrászból 24 betegszik meg évente az olló vagy más fémeszközök és kemikáliák használata miatt.

Tünetek

A fémallergia az esetek többségében bőrtünetekkel jelentkezik, a pikkelyesen száraz bőr és a sebes foltok már ekcémára utalnak.

- Bőrvörösség, csalánkiütésszerű vörös foltok.
- Múlni nem akaró viszketés.
- Duzzadt, hámló, kiszáradt bőr.
- Ha huzamosabb ideje vannak tünetek, a bőr megvastagodik, elszarusodik, berepedezik.
- A legfeltűnőbb helyeken jelentkezik: az arcon, a nyakon, a kezeken.

Fémporok, fémoldatok belégzése során alakul ki:

- Légutak gyulladása
- nátha

Kozmetika

A bőrérzékenység egyre több ember problémája. Az érzékeny bőr ápolása, a professzionális és az otthoni készítmények megválasztása nagy körültekintést igényel.

Életkor és bőrtípus

Az érzékeny bőr textúráját tekintve lehet száraz és zsíros. Kamaszkorban rendszerint még a zsíros, pattanásos bőr okoz problémát, de valakinél már ekkor is jelentkezhet némi érzékenység bizonyos aknés bőrt kezelő szerekre. A bőrérzékenység tipikus jelei azonban jellemzően fiatal felnőttkorban alakulnak ki.

A bőrérzékenység jelei

- bőrpír
- kiütések
- bőrszárazság

Az érzékeny bőr és a bőrrallergiák mellett bizonyos bőrbetegségek - például a rozácea, seborrhea, vagy a pikkelysömör - is nehezítik a megfelelő kozmetikum kiválasztását.

Érzékenység, vagy allergia?

Az érzékenységet és az allergiát jól meg kell különböztetnünk. Az érzékeny bőr fogalma nem feltétlenül jelent allergiás állapotot, azonban az érzékeny bőr könnyebben reagál allergiával bizonyos külső hatásokra. Ezért nagyon fontos, hogy a vendég arckezelésének megkezdése előtt, azon kívül, hogy szemünkkel felmérjük, hogy milyen a bőre, érdemes megkérdezni, hogy van-e bármilyen típusú ismert allergiája, vagy konkrétan rákérdezni egyéb betegségekre, gyógyszereszedési szokásaira. Nem biztos, hogy a vendég, amikor kezelésre jelentkezik, magától elmondja, hogy például rendszeresen szed fényérzékenységet vagy hámvékonyodást okozó gyógyszereket. Fontos azt is megkérdezni, hogy kap-e immunállapotot, sebgyógyulást befolyásoló kezelést.