



NINCS JOBB AZ ANYATEJNÉL

Sokszor hallani egyes anyukáktól azt a panaszt, hogy "vizes a tejem". Ilyenkor el akarják hagyni a szoptatást, és inkább áttérnének a tápszerre. Ne tegyék! Az anyatej ugyanis nemcsak a baba jóllakatására, hanem folyadékpótlásra is szolgál. Ezért a szoptatás elején hígabb a tej, hogy a baba először a szomját oltsa, majd a végén töményebb nedűvel tölti meg a kicsi gyomrát.



MEGELŐZÉSRE: HA

A csecsemőnek hat hónapos korig anyatejre van szüksége, de sajnos előfordul, hogy ez nem elegendő, vagy az anya valamilyen okból nem tud szoptatni. Ilyenkor tápszerre szorulhatunk. (Még mindig jobb, mint a tehéntej!) Allergiás családok gyermekének mindenképpen, de féléves korig a többeieknek is ajánlott a hipoallergén (nem allergizáló) tápszer. Az úgynevezett HA tápszerek orvosi javallatra írhatók fel azoknak a babák-



nak, akiknek a családjában igazolható az allergia, vagy akiknél bebizonyosodott, hogy az anyatej nem elegendő. Ha a babának diagnosztizált tejfehérje-allergiája van, akkor speciális étrendre szorul, és ehhez mindenképpen konzultáljunk az orvosunkkal, ne próbáljuk meg magunk kitalálni, hogy mit adhatunk a kicsinek.



Lässig Double Coco étel- és italtároló Két hagyományos méretű cumisűveg tárolására alkalmas. Több órán keresztül melegen tartja az űvegeket. Hordozófüllel is ellátták.


Ára: 3990 Ft



Canpol Lovi kézi mellszívó Műanyag tölcsére jól illeszkedik az anyamellhez. Könnyű, egykezes működtetésű. A szívás erőssége szabályozható. Az anyatej közvetlenül az üvegbe folyik, ez a tartozék etetőcumival egyszerűen cumisűveggé alakítható. Ára: 6790 Ft



A tápszerből csakis annyit adagoljunk, amennyi a baba életkorához javasolt. Az adagolást nem véletlenül tüntetik fel. A sűrűbb tápszertől étvágytalan lesz, arcán kiütések jelentkezhetnek, emésztési problémái lehetnek. A hígabb tápszertől viszont éhes marad, és nem fejlődik megfelelően. Mindig az életkorának megfelelő tápszert kapja, hiszen csak annak az összetétele felel meg az igényeinek. Anyatejből annyit eszik, amennyire szüksége van, azzal gyakorlatilag nem tudjuk túletetni. Ráadásul az anyatej alkalmazkodik a baba szükségletéhez: napról napra más összetételű.



Mindig legyen otthon tartalék tápszerünk: ha kifogy, nem kell útra kelni, hogy az éjszaka közepén utánpótlásra vadásszunk. Ha van otthon esetleg egy másik márkából, akkor felesleges a nyakunkba venni a várost, hogy felkutassunk egy éjjel-nappalit vagy egy ügyeletes gyógyszertárat: a legtöbb tápszer összetétele – ha az életkornak megfelel – megegyezik. Ha azonban a hipoallergén vagy más speciális tápszerünk fogy ki, akkor ne adjunk a babának semmi mást, különösen ne tehéntejet.



Ez hat hónapos kor környékén lehetséges, amikor az anyatej már nem nyújt elegendő kalóriát. Megdőlt az a hit, hogy minél később kap a baba lisztes ételt, annál kisebb a valószínűsége a lisztérzékenység kialakulásának. Újabban már féléves kor körül javasolják az efféle ételek bevezetését. A főzelékek rántása, habarása is szóba jöhet.